

Ai Responsabili delle Strutture di
Coordinamento per le Attività Trasfusionali delle
Regioni e Province Autonome

Alla Direzione del Servizio Trasfusionale
delle Forze Armate

Alle Strutture Regionali di Sanità Pubblica

E, p. c.:

Alle Associazioni e Federazioni Donatori Sangue:

AVIS

CRI

FIDAS

FRATRES

Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello

Capo Dipartimento

Dipartimento della prevenzione, della ricerca e
delle emergenze sanitarie

Dott. Sergio Iavicoli

Direttore Generale

Dott. Mauro Dionisio

Direttore Ufficio 4 – Trapianti, sangue ed
emocomponenti

Direzione Generale della Prevenzione

Dott.ssa Giovanna Laurendi

Direttore Ufficio 2 - Prevenzione e profilassi delle
malattie trasmissibili

Direzione Generale delle Emergenze sanitarie

Ministero della Salute

Dott.ssa Anna Teresa Palamara

Direttore Dipartimento Malattie Infettive

Dott. Giuseppe Feltrin

Direttore Centro Nazionale Trapianti

Dott. Giulio Pisani

Direttore Centro Nazionale per il Controllo e
Valutazione dei Farmaci (CNCF)

Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Nicoletta Sacchi

Direttore Registro Nazionale Donatori di Midollo
osseo (IBMDR)

Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Chikungunya virus mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Dipartimenti del Gard, della Drôme, delle Bocche del Rodano e della Corsica del Sud (Francia).



Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963
Email: segreteria generale.cns@iss.it

A seguito della segnalazione dell'*European Centre Disease and Control – ECDC*¹ di casi umani autoctoni confermati di infezione da virus Chikungunya (CHIKV) nei **Dipartimenti del Gard, della Drôme, delle Bocche del Rodano e della Corsica del Sud (Francia)**, si raccomanda di:

- rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attivando la sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per viaggi nelle aree interessate dall'evento;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nelle aree dove sono stati registrati i casi autoctoni confermati di infezione da CHIKV;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con anamnesi positiva per infezione da CHIKV (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con l'infezione da CHIKV);
- sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con l'infezione da CHIKV oppure in caso di diagnosi di infezione da CHIKV nei 14 giorni successivi alla donazione (*post donation information*).

I Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali sono invitati a dare tempestiva attuazione alle suddette indicazioni, informando puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti nelle Regioni/Province autonome di rispettiva competenza, anche per gli aspetti inerenti le Banche di sangue cordonale, ove presenti.

Lo scrivente Centro nazionale aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica internazionale.

Il Direttore del Centro nazionale sangue

Dott. Vincenzo De Angelis



Responsabili sanitari:

Dott.ssa Ilaria Pati

Responsabile Settore Emovigilanza
e sorveglianza epidemiologica

Dott.ssa Ursula La Rocca

f.f. Direttore Area Sanitaria

Referente amministrativo:

Dott. Giacomo Silvioli

Responsabile Segreteria Generale

segreteria generale.cns@iss.it

¹European Centre for Disease Prevention and Control. Weekly Communicable Disease Threats Report, Week 26, 21 - 27 June 2025.