



Ai Responsabili delle Strutture di Coordinamento per le Attività Trasfusionali delle Regioni e Province Autonome

Alla Direzione del Servizio Trasfusionale delle Forze Armate

Alle Strutture Regionali di Sanità Pubblica

E, p. c.:

Alle Associazioni e Federazioni Donatori Sangue:

AVIS

CRI

FIDAS

FRATRES

Alla Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello

Capo Dipartimento

Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie

Al Dott. Sergio Iavicoli

Direttore Generale

Al Dott. Mauro Dionisio

Direttore Ufficio IV – Trapianti, sangue ed emocomponenti

Direzione Generale della Prevenzione

Alla Dott.ssa Giovanna Laurendi

Direttore Ufficio II – Prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili

Direzione Generale delle Emergenze sanitarie

Ministero della Salute

Al Prof. Rocco Bellantone

Presidente

Alla Dott.ssa Anna Teresa Palamara

Direttore Dipartimento Malattie Infettive

Al Dott. Giuseppe Feltrin

Direttore Centro Nazionale Trapianti

Al Dott. Giulio Pisani

Direttore del Reparto Farmaci Biologici e Biotecnologici - Centro Nazionale per il Controllo e Valutazione dei Farmaci (CNCF)

Istituto Superiore di Sanità

Alla Dott.ssa Nicoletta Sacchi

Direttore Registro Nazionale Donatori di Midollo osseo (IBMDR)

Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Chikungunya virus mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Dipartimenti delle Landes e dei Pirenei Atlantici (Francia).



Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma

Tel: +39 06 4990 4953 / 4963

Email: segreteria generale.cns@iss.it

A seguito della segnalazione dell'European Centre Disease and Control – ECDC¹ di casi umani autoctoni confermati di infezione da virus Chikungunya (CHIKV) nei **Dipartimenti francesi delle Landes e dei Pirenei Atlantici**, si raccomanda di:

- rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attivando la sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per viaggi nell'area interessata dall'evento;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nell'area dove sono stati registrati i casi autoctoni confermati di infezione da CHIKV o, in alternativa, l'esecuzione del test CHIKV NAT;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con anamnesi positiva per infezione da CHIKV (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con l'infezione da CHIKV);
- sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con l'infezione da CHIKV oppure in caso di diagnosi di infezione da CHIKV nei 14 giorni successivi alla donazione (*post donation information*).


Le misure di sospensione di cui sopra non si applicano nel caso di donazione mediante aferesi di piastrine e/o plasma ad uso clinico, qualora sottoposti a procedura di riduzione dei patogeni mediante tecniche inattivazione virale con dimostrata efficacia verso il CHIKV, e in caso di donazione di solo plasma, se esso è destinato alla produzione industriale di medicinali plasmaderivati.

I Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali sono invitati a dare tempestiva attuazione alle suddette indicazioni, informando puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti nelle Regioni/Province autonome di rispettiva competenza.

Lo scrivente Centro nazionale aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica internazionale.

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue

Prof.ssa Luciana Teofili



Responsabili sanitari:
Dott.ssa Ursula La Rocca
Direttore Area Sanitaria

Dott.ssa Ilaria Pati
Responsabile Settore Emovigilanza e Sorveglianza Epidemiologica

Referente amministrativo:
Dott. Giacomo Silvili
Responsabile Segreteria Generale
segreteria generale.cns@iss.it

¹ECDC. Seasonal surveillance of chikungunya virus disease in the EU/EEA, weekly report. <https://chik-weekly.ecdc.europa.eu/>.